

## **Neotigason**

### **Hvordan virker Neotigason ?**

Neotigason er kemisk beslægtet med A-vitamin. Behandling med Neotigason medfører, at huden bliver tyndere. Dette udnyttes til behandling af hudsygdomme, hvor hornlaget er fortykket. Det kan dreje sig om psoriasis og nogle sjældne hudsygdomme.

Virkningen indtræder i reglen efter adskillige ugers behandling. I reglen fortsættes behandlingen i måneder, hvorefter den så vidt muligt aftrappes.

### **Hvordan tages Neotigason ?**

Kapslerne bør tages med mælk og evt. i forbindelse med et måltid.

### **Neotigason og anden medicin:**

Da Neotigason er beslægtet med A-vitamin, bør man i behandlingsperioden ikke tage mere A-vitamin daglig end det, der er i en almindelig vitamintablet. Neotigason bør ikke anvendes sammen med Tetracyclin.

### **Bivirkninger:**

Næsten alle får tør hud og tørre læber i løbet af behandlingsperioden. Slimhinder i øjne og næse kan også udtørre. Dette kan føre til besvær med at bruge kontaktlinser og til næseblod. Fede cremer hæmmer udtørringen af huden. Læbepomade og vaseline kan anvendes på læberne og i næseborene.

Under behandlingen kan fedtmængden i blodet stige, og leveren kan påvirkes. Derfor tages blodprøver under behandlingen. Denne kontrol har særlig betydning for personer med sukkersyge, og hvis man er overvægtig.

Sjældne bivirkninger omfatter led- og muskelsmerter samt påvirkning af leveren. Hårtab kan forekomme.

Alle disse bivirkninger er ufarlige og svinder , når man ophører med behandlingen eller nedsætter dosis. Ved langvarig behandling kan der i sjældne tilfælde ses knogleforandringer.

### **Prævention, graviditet og amning:**

Neotigason er fosterbeskadigende. Derfor er det ved behandling af kvinder vigtigt at bruge sikker prævention i behandlingsperioden og mindst 2 år efter ophør af behandlingen. Man må under ingen omstændigheder blive gravid, mens man behandles med stoffet eller indtil 2 år efter afsluttet behandling. Skulle graviditet opstå i denne periode, må abort tilrådes.

Amning frarådes i behandlingsperioden.

Neotigasonkapsler må ikke gives til andre. Aflever evt. overskydende medicin på apoteket.

Blodprøvekontrol: hver 4. uge de første 2 måneder, derefter hver 3. måned. Diabetikere kontrolleres med samme interval. Graviditetstest hver 4. uge hvor relevant.

Juni 2018 (ACL)

Revideres efter behov, dog senest juni 2021.